

KALENDARZ SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

Dzieci powinny otrzymać następujące szczepionki:

- Do 6 miesięcy trzy dawki DTP Hib* oraz polio i Men C*
- W wieku 15 miesięcy MMR
- Przed rozpoczęciem nauki w szkole DtaP i polio; drugą dawkę MMR
- Między 10 a 14 rokiem życia BCG #
- Przed ukończeniem szkoły piątą dawkę polio oraz Td

Osoby dorosłe powinny otrzymać następujące szczepionki:

- Kobiety seronegatywne względem różyczki: przeciw różyczce
- Osoby wcześniej nie szczepione: polio, tężec, błonica i *Neisseria meningitidis* C
- Grupy wysokiego ryzyka: w.z.w. typu B, w.z.w. typu A, grypa, szczepionka przeciw *Streptococcus pneumoniae*

* W Polsce szczepienia zalecane.

Główny Inspektor Sanitarny w piśmie z dnia 21.10.2005 r. zalecił zaprzestanie szczepień gruźlicy w 12 miesiącu oraz 7 i 12 roku życia [przyp. tłum.].

SZCZEPIONKI

Szczepionki żywe	Szczepionki inaktywowane
Odra } Świnka } oraz MMR Różyczka }	Błonica anatoksyna } Tężec anatoksyna } Krzusiec } oraz szczepionki skojarzone
<i>Poliomyelitis</i> doustna	<i>Poliomyelitis</i> (pozajelitowa)
Dur brzuszny doustna	<i>Haemophilus influenzae</i> b (Hib)
BCG (TB)	Grypa
Żółta gorączka	Wirusowe zapalenie wątroby typu A
	Dur brzuszny (pozajelitowa)
	Meningokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
	Japońskie zapalenie mózgu
	Kleszczowe zapalenie mózgu
	Wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
	Wścieklizna
	Cholera

DAWKI PROFILAKTYCZNE LEKÓW PRZECIWXIMNICZYCH U DZIECI* (W TABLETKACH)

Wiek	Do 12 tygodni	3–11 miesięcy	1–3 lata	4–7 lat	8–12 lat	> 13 lat
Waga	<6 kg	6–9 kg	10–15 kg	16–24 kg	25–44 kg	>45 kg
Chlorochina	0,125 dawki	0,25 dawki	0,375 dawki	0,5 dawki	0,75 dawki	pełna dawka
(w przeliczeniu na postać zasada-chlorochiny (nie sól))	¼ tabletki	½ tabletki	¾ tabletki	1 tabletki	1½ tabletki	2 tabletki
Proguanil	0,125 dawki	0,25 dawki	0,375 dawki	0,5 dawki	0,75 dawki	pełna dawka
100 mg	¼ tabletki	½ tabletki	¾ tabletki	1 tabletki	1½ tabletki	2 tabletki