

Zmiany w funkcjonowaniu poznawczym u hospitalizowanych pacjentek z jadłowstrętem psychicznym

Changes in cognitive functioning in anorexic hospitalised patients

ANNA CWOJDZINSKA, FILIP RYBAKOWSKI

Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

STRESZCZENIE

Cel: Celem badania było wykrycie ewentualnych zmian w funkcjonowaniu poznawczym, powstających w czasie hospitalizacji pacjentek z jadłowstrętem psychicznym. **Metody-** Badanie zostało przeprowadzone z udziałem 5 pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego, stosując Test Sortowania Kart Wisconsin (WCST), Kwestionariusz Depresji Becka (BDI), Kwestionariusz EAT-26 i Kwestionariusz Przekonań w Zaburzeniach Odżywiania. **Wyniki:** Uzyskane wyniki nie wskazują na istnienie istotnych różnic między wybranymi charakterystykami funkcjonowania poznawczego na początku i na końcu okresu hospitalizacji. **Wnioski:** W obrębie badanej próby nie wystąpiły istotne różnice w funkcjonowaniu poznawczym, zaobserwowano natomiast pewne zmiany w obrębie charakterystyk poznawczych. Mogą na nie wpływać oddziaływania, jakim pacjentki są poddawane w czasie leczenia szpitalnego oraz ich efekty w postaci m. in. wzrostu masy ciała czy zmniejszenia nasilenia cech psychopatologicznych (objawów jadłowstrętu czy depresji).

SUMMARY

Objectives: The aim of the study was to investigate possible changes in cognitive functioning of anorexic patients during inpatient treatment. **Methods:** Participants of the study (n = 5) were tested with Wisconsin Card Sorting Test (WCST), Beck Depression Inventory (BDI), EAT-26 Questionnaire and Eating Disorders Belief Questionnaire. **Results:** Results do not show difference between the characteristics of patients' cognitive functioning in the beginning and in the end of inpatient treatment. **Conclusions-** No changes in the level of cognitive functioning were found, but some changes in cognitive characteristics were observed. They may be caused by hospitalization and treatment effects like gaining weight or psychopathological symptoms reduction (i.e. of anorexia or depression).