

Postępowanie z węzłami chłonnymi pachy u kobiet z rakiem piersi

Management of the axilla in women with breast cancer

John R Benson, G Querci della Rovere i Grupa Twórców Standardów Postępowania z Węzłami Chłonnymi Pachowymi*

Podejście do chirurgii węzłów chłonnych pachy powinno dawać wybór oraz być zmienne - w zależności od postępowania skupiającego się na wyborze pacjentki oraz cechach guza, a także dostosowane do miejscowych standardów postępowania oraz dostępnych warunków ubezpieczenia. Biopsja węzła wartowniczego została uznana za działanie standardowe w wielu ośrodkach na świecie i zrewolucjonizowała postępowanie z węzłami chłonnymi pachy w ciągu ostatniego dziesięciolecia. Mimo to dane z wyników odległych są trudne do uzyskania i obserwowane są utrzymujące się różnice w wykonaniu i niezgodności w metodologii. Międzynarodowe spojrzenie w kontekście tego problemu skierowano na ważne sprawy związane z postępowaniem z węzłami chłonnymi pachy, do których należą nie tylko wskazania do wykonania biopsji węzła wartowniczego pachy oraz zastosowana technika, ale także sposób pobrania próbek z tego węzła, wykonania wycięcia węzłów chłonnych z pachy i samej obserwacji. W tym doniesieniu przedstawiamy wstępnie przegląd, który skupia się na modelach biologicznych sieci limfatycznych w piersi i sposobach rozsiewu guza. Zestaw kluczowych pytań został zaopatrzony wstępnie komentarzami od autorów, z przedstawieniem kolektywnych punktów widzenia ekspertów z kilku krajów wobec tych kwestii.

