

Zastosowanie tracheotomii przezskórnej w trybie pilnym u chorego z zeszywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa - opis przypadku

Emergency percutaneous tracheotomy in patient with ankylosing spondylitis. Case report

Jarosław Mamak

W pracy przedstawiono pilne użycie tracheostomii przezskórnej u pacjenta z zeszywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa. U 56-letniego mężczyzny z zaawansowanym zeszywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa wystąpiła ciężka niewydolność oddechowa w przebiegu wstrząsu septycznego. Próby intubacji okazały się nieskuteczne. Doszło do zatrzymania krążenia. Podjęto skuteczną resuscytację. Wykonano u niego pilną tracheotomię przezskórną. Pacjenta przewieziono na OIT. Odzyskał on przytomność i po 23 dniach przekazano go na oddział ortopedyczny. Po kolejnych 24 dniach pacjenta wypisano ze szpitala. Tracheotomia przezskórna może być użyteczną metodą postępowania w podobnych przypadkach.

The paper describes emergency percutaneous tracheostomy in a patient with ankylosing spondylitis. A 56-year-old patient with severe ankylosing spondylitis had severe respiratory failure related to septic shock. Intubation attempts were unsuccessful. The patient developed cardiac arrest. He was successfully resuscitated. Emergency percutaneous tracheostomy was successfully performed. The patient was transferred to the Intensive Care Unit. No technical complications were noted. The patient recovered and after 23 days he was transferred to the orthopaedic ward. After next 24 days he was discharged from the hospital. The percutaneous tracheostomy technique may be useful in similar patients.