

Nieoperacyjne leczenie po neoadiuwantowej chemioradioterapii z powodu raka odbytnicy

Non-operative treatment after neoadjuvant chemoradiotherapy for rectal cancer

Brian D P O'Neill, Gina Brown, R J Heald, David Cunningham, Diana M Tait

Lancet Oncol 2007; 8, 7: 625-33

Miniona dekada przyniosła zmiany w leczeniu miejscowo zaawansowanego raka odbytnicy. Historycznie, standard postępowania, obejmował chirurgię z następową radioterapią lub chemioterapią uzupełniającą. Ostatnio, pojawiła się chemioradioterapia neoadiuwantowa, co fundamentalnie zmieniło postępowanie z pacjentami z chorobą miejscowo zaawansowaną. W badaniach klinicznych, całkowite odpowiedzi kliniczne na poziomie powyżej 25% zrodziły pytanie, czy można uniknąć chirurgii w określonej grupie pacjentów. Badanie kliniczne, w którym pominięto chirurgię u wybranych pacjentów z całkowitą odpowiedzią kliniczną po przedoperacyjnej chemioradioterapii, wykazało korzystne wyniki odległe. W tym artykule autorzy punktuja ważne czynniki, potrzebne do osiągnięcia całkowitej odpowiedzi patologicznej, dotychczasowe strategie postępowania nieoperacyjnego, metody oceny predykcji dla odpowiedzi na chemioradioterapię i wytyczne na przyszłość z dołączeniem badania NMR, jako radiologicznego potwierdzenia do stwierdzenia całkowitej remisji.