

# Zakażenia przenoszone drogą płciową

Sexually transmitted infections

**Eimear KIERAN, Daniel P. HAY**

Current Obstetrics & Gynaecology 2006;16:218-225

## STRESZCZENIE

W ogłoszonym niedawno raporcie („białej księdze”) zatytułowanym *Choosing Health: making healthy choices early* (Wybieramy zdrowie: ułatwianie dokonywania prozdrowotnych wyborów) rząd brytyjski przedstawił działania zmierzające do ustalenia priorytetów w profilaktyce i leczeniu w ramach państwowej służby zdrowia chorób przenoszonych drogą płciową. Raport jest odpowiedzią na bezprecedensowe zwiększenie liczby zakażeń przenoszonych drogą płciową (z.p.d.p.; STIs - *sexually transmitted infections*) w ostatnich latach. Obserwuje się wzrost obciążonych wysokim ryzykiem zachowań seksualnych, niewiedzę dotyczącą ich konsekwencji oraz zwiększenie liczby nowych przypadków zakażeń w związku z migracją ludności z krajów rozwijających się. Zakażenia za granicą w wyniku tzw. turystyki seksualnej są także czynnikiem wpływającym na zachorowalność, podobnie jak rozwijanie się zakażeń lekoopornych. Wczesne rozpoznanie zakażenia ma zasadnicze znaczenie dla zapobiegania następstwom lub ich złagodzenia. Położnicy i ginekolodzy są często lekarzami pierwszego kontaktu dla tych pacjentek. Następnie konieczna jest współpraca ze specjalistami chorób układu moczowo-płciowego. Konieczność zastosowania bezpiecznego leczenia i zapobiegania przenoszeniu zakażenia z matki na dziecko u kobiet w ciąży stanowi dodatkowe wyzwanie dla położników.

In the recent white paper 'Choosing Health: making healthy choices easier', the UK Government outlined the actions required to prioritise sexual health care in the NHS. This is in response to an unprecedented rise in sexually transmitted infections (STIs) in recent years. There has been an increase in high-risk sexual activity, ignorance regarding consequences and higher incidence of infection resulting from migration from developing countries. Acquisition abroad via so-called 'sex tourism' is also a factor in prevalence, as is the development of drug-resistant infections. Early identification of infection is crucial to prevent or ameliorate sequelae. Obstetricians and gynaecologists will often be patients' first point of contact; thereafter, liaison with genitourinary medicine colleagues is vital. Special consideration of safe treatments and prevention of vertical transmission in pregnant patients present obstetricians with extra challenges.

© 2006 Elsevier Ltd. All rights reserved.