

Poronienia nawracające

Recurrent miscarriage

Siobhan QUENBY MD MRCOG

OBSTETRICS, GYNAECOLOGY AND REPRODUCTIVE MEDICINE 17:10

STRESZCZENIE

Poronienie jest jednym z najczęstszych powikłań ciąży. 15% klinicznie rozpoznanych ciąż kończy się poronieniem. Główną przyczyną samoistnego poronienia są genetyczne lub rozwojowe nieprawidłowości płodu. Nawracające poronienie występuje u 3% populacji i wiąże się z trombofilią, niewydolnością szyjki macicy, zakażeniem oraz czynnikami hormonalnymi, anatomicznymi i immunologicznymi. Metody leczenia mającego zapobiegać poronieniu pozostają w znacznej mierze niesprawdzone przez randomizowane kontrolowane badania kliniczne lub medycynę opartą na faktach, a uzyskane wyniki rozczarowują pacjentki i personel medyczny. Zamysłem tego artykułu jest ćwiczenie myślenia analitycznego i doskonalenie umiejętności klinicznych w dziedzinie o bogatej i prezentującej sprzeczne poglądy literaturze.

Miscarriage is one of the most common complications of pregnancy; 15% of clinically recognized pregnancies end in miscarriage. The major cause of spontaneous miscarriage is genetic or developmental abnormalities of the fetus. Recurrent miscarriage occurs in 3% of the population and has been associated with thrombophilia, cervical weakness, infection, and endocrine, anatomical and immune factors. Treatments to prevent miscarriage remain largely untested by randomized controlled trials or evidence-based practice. The resulting consequences have been disappointing for both patients and health-care providers. This article is therefore designed to enhance critical thinking and improve clinical skills in an area with an extensive and contradictory literature.

© 2007 Elsevier Ltd. All rights reserved.

