

Nowotwory złośliwe gardła w latach 1992-2001

Malignant tumours of the pharynx in the years 1992-2001

Zygmunt Szmeja, Stanisław Betlejewski, Tatiana Gierek, Czesława Tarnowska, Dariusz Jurkiewicz, Katarzyna Nowak, Elżbieta Waśniewska, Barbara Malinowska

Streszczenie

Na podstawie danych retrospektywnych z lat 1992-2001, pochodzących z pięciu ośrodków klinicznych w Polsce, dokonano analizy przypadków nowotworów złośliwych gardła z wyłączeniem guzów języka. Opracowaniu poddano 1016 przypadków nowych zachorowań. W badanym dziesięcioleciu stwierdzono istotny, ponad 50% wzrost zachorowalności, zwłaszcza na nowotwory części ustnej gardła. W analizowanym materiale dominowali mężczyźni (3:1), a szczyt zachorowań obniżał się wyraźnie. Chorzy z zaawansowanymi nowotworami gardła stanowili 26%. Najczęstszym rozpoznaniem histopatologicznym był rak płaskonabłonkowy, a najczęstszą lokalizacją gardło środkowe, zwłaszcza migdałek podniebienny. Dane z ośrodka katowickiego, gdzie przeważały nowotwory części krtaniowej gardła, budzą obawę o podobną tendencję wzrostu również w innych ośrodkach.

Summary

All cases of malignant tumours of the pharynx (excluding tumours of the tongue) were analyzed based on the retro-spective data from the 5 clinical centers in Poland from the years 1992-2001. A considerable - over 50% increase in morbidity was found out regarding particularly tumours of the oropharynx. In the analyzed material there is a pre-dominance of males (3:1) and the peak of morbidity significantly falls. The subjects with advanced tumours of the pharynx made 26% of the studied group. The most common histopatological diagnosis was squamous cell carcinoma and the most common site - the oropharynx, in particularly the tonsil. The data the center in Katowice, where tumours of the hypopharynx have been predominant in the last few years, may point a similar tendency in the other centers in the future.