

Choroby skóry sromu

Skin disorders affecting the vulva

Jonathan BATCHELOR

Jane STERLING

OBSTETRICS, GYNAECOLOGY AND REPRODUCTIVE MEDICINE 18:3

STRESZCZENIE

Skóra sromu stanowi złożoną kombinację rogowaciejącej, owłosionej skóry warg sromowych większych i okolicy wzniesienia łonowego; cieńszej, pofałdowanej, ale rogowaciejącej skóry warg sromowych mniejszych i przyległego przedsionka pochwy, gdzie rozpoczyna się błona śluzowa wyścielająca pochwę. Otaczające pośladki, szpara odbytu i skóra pokrywająca wewnętrzną część ud przyczyniają się do wytworzenia stosunkowo zamkniętego mikrośrodowiska i dużej wilgotności. Choroby skóry, które mogą występować również w innych miejscach, mogą mieć nieco odmienną postać w okolicy sromu. Różne choroby skóry występują częściej w okolicy odbytu i narządów płciowych niż w innych regionach ciała.

SUMMARY

The skin of the vulva constitutes a complex mixture of keratinized hairbearing skin of the labia majora and pubic area, the thinner rugose but keratinized skin of the labia minora, and the adjacent vaginal introitus where the mucosal surface of the vagina begins. The surrounding buttock, natal cleft and inner thigh skin contribute to the relatively occluded microenvironment and high humidity. Skin disorders that can affect any part of the skin can appear slightly different in the vulval area; various disorders occur more frequently at ano-genital sites than elsewhere on the body.

Copyright 2008 Elsevier Ltd. All rights reserved.