

Diagnostyka ultrasonograficzna ostrych stanów w ginekologii - przegląd i opis przypadków.

Lil Valentin

Streszczenie

W niniejszej pracy przedstawiono ultrasonograficzne cechy kilku ostrych stanów w ginekologii: ciąży ektopowej, krwotocznego ciała żółtego, skręcenia torbieli przydatków, zapalenia przydatków, ostrej martwicy mięśniaka, krwiaka pochwy (*haematokolpos*) oraz krwiaka macicy (*haematometra*). Podstawą w diagnostyce ostrych stanów w ginekologii jest dokładne zebranie wywiadu medycznego oraz badanie fizykalne. Badanie ultrasonograficzne powinno być wykonywane tylko w sytuacjach, gdy jego wynik może zmienić postawioną na podstawie badania klinicznego diagnozę. W sytuacji, gdy wynik badania USG jest nieprawidłowy, należy ocenić, czy tłumaczy on objawy kliniczne prezentowane przez pacjentkę, czy też jest po prostu przypadkowym znaleziskiem. Jeśli wynik badania ultrasonograficznego jest całkowicie prawidłowy, prawdopodobieństwo występowania ostrej patologii w miednicy mniejszej jest małe.

Słowa kluczowe: ultrasonografia, ostre stany, ból