

## **Współpraca w leczeniu poszpitalnym osób chorych na schizofrenię hospitalizowanych bez zgody**

Compliance in out-patients treatment of schizophrenic patients hospitalized without consent

*BERTRAND JANOTA, MARIA ZAŁUSKA*

### STRESZCZENIE

Cel pracy: Poznanie związku między przyjęciem bez zgody chorych ze schizofrenią do szpitala psychiatrycznego a koniecznością podjęcia leczenia i liczbą rehospitalizacji w okresie W miesięcy po wypisie. Metoda: Retrospektywnej analizie poddano 28 osób [p kobiet i u mężczyzn] z rozpoznaniem schizofrenii, przyjętych bez zgody na mocy art. 23 Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego do W Kliniki Psychiatrii IPiN, w okresie od stycznia 2002 do czerwca 2003 roku. Grupę kontrolną stanowiło 28 osób dobranych według rozpoznania i wieku spośród chorych przyjętych za zgodą w tym samym okresie. Wyniki: Grupy nie różniły się istotnie statystycznie pod względem liczby mężczyzn, poziomu wykształcenia, sytuacji socjalnej, liczby dotychczasowych hospitalizacji. W czasie badania było istotnych różnic między grupami pod względem częstości stosowania przymusu bezpośredniego i uczestnictwa członków rodzin w psychoedukacji. Wśród chorych przyjmowanych bez zgody w porównaniu z osobami z grupy kontrolnej obserwowana hospitalizacja trwała średnio dłużej, rzadziej stosowano neuroleptyki nowej generacji, a częściej klasyczne oraz iniekcje o przedłużonym działaniu. Po wypisie ze szpitala odsetek osób, które w okresie w miesiący nie podjęły leczenia ambulatoryjnego, a także liczba osób rehospitalizowanych nie różnicowały statystycznie znamienne porównywanych grup. Wnioski: Nie wykazano związku pomiędzy przyjęciem bez zgody do szpitala a podejmowaniem lub niepodjęciem leczenia ambulatoryjnego i liczbą rehospitalizacji w okresie 10 miesięcy po wypisie. Istnieje potrzeba zbadania w większej grupie chorych (przyjmowanych bez zgody i za zgodą) czynników występujących podczas hospitalizacji i mających znaczenie dla współpracy w leczeniu poszpitalnym.

### SUMMARY

**Objects:** To study the relationship between the admission to the hospital without consent and taking up the outpatient treatment after the discharge. **Methods:** 28 patients with schizophrenia, admitted without consent (art 23) between January 2002 and Jun 2003 to IV Psychiatric Clinic of IPiN were retrospectively analyzed after ten month from their discharge. The 28 control patients with the same diagnoses and age were selected from those admitted in the same time with consent. **Results:** There were not significant differences between the groups in the number of males, educational level, socioeconomic status, number of past hospitalizations, frequency of coercion in the course factual hospitalization and participation of family in psychoeducation. In the group admitted without consent the duration of observed hospitalization was on average longer, the neuroleptics of new generation were recommended not so frequent, as classical neuroleptics and depot injections. For w months after the discharged, the percentages of patients who were not undertaking the treatment; as so as the number of re-hospitalizations were not differentiating significantly the groups. **Conclusion:** No relationship between the admission without consent to the hospital and giving up, or taking up the outpatient treatment, as so as the number of rehospitalisations for the ten months after the discharge was proved. The investigation in the more numbered groups is needed