

## **Zaburzenia psychiczne w reumatologii**

Mental disorders in rheumatology

*KLAUDIUSZ PAPIERSKI, ANNA RACZKIEWICZ-PAPIERSKA*

### STRESZCZENIE

Celem pracy było ustosunkowanie się do znaczenia klinicznego zaburzeń psychicznych u chorych na choroby reumatyczne, na podstawie piśmiennictwa z zakresu reumatologii, psychiatrii i neurologii z lat 1997—2004. Ustalono, że częstość Zaburzeń depresyjnych i lękowych w tej grupie chorych wydaje się podobna jak w populacjach chorych z innymi przewlekłymi chorobami somatycznymi. Łagodne zaburzenia poznawcze występują stosunkowo często w układowych chorobach tkanki łącznej z towarzyszącym zajęciem mózgowia. Epizody psychotyczne są jednymi z najpoważniejszych powikłań tocznia rumieniowatego układowego, twardziny, zespołu Sjögrena i wymagają dokładnej diagnostyki różnicowej. Problemy psychologiczne i psychiatryczne występują często w przebiegu chorób reumatycznych. Jednak jak dotąd zagadnienia te nie były wystarczająco doceniane w ogólnej praktyce klinicznej. Większość prezentowanych badań przeprowadzili specjaliści reumatologii, nie znający dokładnie współczesnej nomenklatury psychiatrycznej. Wydaje się konieczna lepsza kooperacja między reumatologami i psychiatrami w tej dziedzinie.

### SUMMARY

The aim of the study was to evaluate the clinical significance of mental disorders in people suffering from rheumatic diseases. According to rheumatologic, psychiatric and neurologic articles published between 1997—2004, estimated frequency of depression and anxiety seems to be similar to other populations with chronic somatic diseases. Mild cognitive impairment is relatively common in connective tissue diseases with brain involvement. Psychotic episodes are the one of the most serious psychiatric complications of lupus erythematosus, scleroderma and Sjögren syndrome and require careful differential diagnosis. Psychological and psychiatric problems are common in rheumatic diseases. So far the problem was underestimated in general medical practice. Most of the presented studies were performed by rheumatologists unfamiliar with psychiatric nomenclature, so there is a need of closer cooperation between rheumatologists and psychiatrists.