

Bezpieczeństwo stosowania leków przeciwdepresyjnych u osób ze schorzeniami układu krążenia - przegląd wytycznych leczenia

Safe use of antidepressants in patients with cardiovascular diseases — guidelines review

SŁAWOMIR MURAWIEC, MAREK GROCHOWSKI

STRESZCZENIE

Choroby układu sercowo-naczyniowego współwystępują często z zaburzeniami depresyjnymi. Współwystępowanie depresji pogarsza przebieg chorób kardiologicznych i rokowanie. Współczynnik nagłych zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych jest wyższy wśród osób ze stwierdzoną chorobą serca i depresją niż u osób nie obciążonych występowaniem depresji. Także po wystąpieniu ostrych epizodów naczyniowych, np. zawału serca, pojawienie się depresji o nasileniu wymagającym leczenia nie jest zjawiskiem rzadkim. Leczenie depresji współwystępującej z zaburzeniami kardiologicznymi wymaga stosowania leków pozbawionych negatywnego wpływu na układ sercowo-naczyniowy i nie wchodzących w interakcje z innymi lekami przyjmowanymi przez chorych. W prezentowanej pracy dokonano przeglądu zaleceń ekspertów odnośnie do bezpieczeństwa stosowania leków przeciwdepresyjnych u pacjentów z chorobami kardiologicznymi. Leki przeciwdepresyjne uważane za względnie bezpieczniejsze od innych to mianseryna, SSRI oraz bupropion. Także mirtazapina i trazo-don wymieniane są jako leki bezpieczne.

SUMMARY

Comorbidity between cardiovascular problems and depression is substantial. Depression very often follows cardiac episodes, in example MI. Antidepressants must be use in different cardiovascular conditions with caution in the context of potential negative influence of cardiovascular system and potential problems with drug interactions. The paper presented reviews the international guidelines and handbooks recommendations of treating depression in patients with cardiovascular diseases. Drugs used to treat depressive conditions with minimal or no cardiac effect are mianserin, SSRI, and bupropion, some guidelines recommend also mirtazapine also trazodone.