

Objawy spowodowane odstawieniem inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny: znaczenie kliniczne, czynniki ryzyka i postępowanie

SSRI discontinuation symptoms: clinical relevance, risk factors and treatment

ANNA LESZCZYŃSKA

STRESZCZENIE

Objawy spowodowane odstawieniem inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) występują przede wszystkim u chorych leczonych preparatami o krótkim czasie półtrwania dłużej niż 2 miesiące. Istotnym czynnikiem ryzyka jest brak współpracy pacjenta z lekarzem. Samowolne odstawianie czy modyfikacja dawek wiąże się z ryzykiem pojawienia się nowych nieprzyjemnych objawów. SSRI należy odstawiać stopniowo. Schemat odstawiania zależy od wielu czynników, m. in. profilu farmakologicznego leku, aktualnej dawki, długości okresu farmakoterapii.

SUMMARY

Selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) discontinuation symptoms are common among patients, especially those receiving short half-life SSRIs for longer than 2 months. The incidence of SSRI discontinuation syndrome appears to be higher by patients who often miss doses or abruptly stop the treatment; hence non-compliance is a significant risk factor. Slow tapering of the SSRIs doses is recommended i.e. pharmacokinetics of the drug, dose taken and length of the treatment need to be taken into consideration.