

Różnice w wymiarach osobowości oceniane inwentarzem TCI pomiędzy grupami: Anonimowych Alkoholików, pacjentów hospitalizowanych z rozpoznaniem ZZA i grupą kontrolną

Differences in personality traits measured by TCI among alcoholics participated in Anonymous Alcoholics, treated in a hospital and healthy controls

SZYMON SYREK, JUSTYNA PEŁKA-WYSIECKA, JOLANTA KUCHARSKA-MAZUR,
MARIUSZ SZNABOWICZ, JERZY SAMOCHOWIEC

STRESZCZENIE

Cel: Alkoholizm jest chorobą przewlekłą, w której przebieg i rokowanie zasadniczo się różnią. Istotną rolę w procesie uzależnienia pełnią cechy osobowości. Model psychobiologiczny osobowości Cloningera uwzględnia podłoże biologiczne pewnych wymiarów osobowości. Kwestionariusz osobowości TCI Cloningera pozwala na ocenę wymiarów osobowości — temperamentu i charakteru. Celem niniejszej pracy była próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy w zbadanych grupach pacjentów, uzależnionych od alkoholu (członkowie Anonimowych Alkoholików, osoby hospitalizowane z powodu powikłań psychiatrycznych Zespołu Zależności Alkoholowej — ZZA) oraz w grupie kontrolnej stwierdza się różnice w cechach osobowości mierzonych kwestionariuszem TCI, oraz czy długość abstynencji od alkoholu wiąże się z cechami osobowości badanych osób. **Materiał i metody:** Do badania zakwalifikowano 43 kobiet i 43 mężczyzn z ruchu Anonimowych Alkoholików, z minimum 6-miesięcznym okresem pełnej abstynencji od alkoholu. Grupa chorych hospitalizowanych z powodu ZZA składała się z 44 mężczyzn i 9 kobiet. Kwestionariusz TCI wypełniali oni w okresie po ustąpieniu objawów alkoholowego zespołu abstynencyjnego. Grupę kontrolną stanowiło 9 kobiet i 70 mężczyzn, niespokrewnionych ze sobą, zdrowych psychicznie. **Wyniki i wnioski:** Dane socjodemograficzne oraz dotyczące przebiegu, częstości i rodzaju występowania powikłań ZZA nie różniły się istotnie statystycznie między grupą Anonimowych Alkoholików a grupą chorych hospitalizowanych. Na podstawie wyników analiz statystycznych nie stwierdza się istotnych statystycznie różnic w częstości występowania typów alkoholizmu wg Cloningera pomiędzy grupą Anonimowych Alkoholików a grupą alkoholików hospitalizowanych. Osoby uczestniczące w spotkaniach Anonimowych Alkoholików i utrzymujące długoletnią abstynencję pod względem cech psychologicznych różnią się od ogółu osób uzależnionych.

SUMMARY

Objectives- Alcoholism is a chronic disease where course and prognosis are essentially different. Personality features play an important role in addiction process. Psychobiological personality model according to R. Cloninger takes into account the biological background of some personality dimensions. TCI Cloninger personality questionnaire allows such features as temperament and character to be evaluated. Aim of following study was to try to answer the questions, were there any differences in personality features measured with the use of TCI questionnaire between the group of alcoholics (members of Anonymous Alcoholics, persons hospitalized due to psychiatric complications of alcohol addiction disease) and control group and was there any linkage between personality features of studied persons and the length of there abstinence. **Material and methods:** 43 women and 43 men, from the group of Anonymous Alcoholics, with minimal time of full alcohol abstinence of 6 months were Qualified to our study. The group of hospitalized patients consisted of 44 men and 9 women. They were tested with the use of TCI questionnaire after the withdrawal of symptoms of alcohol abstinence syndrome. Control group consisted of 9 women and 70 men

with no family relations to each other, all mentally healthy (with no mental disorders). Sociodemographic data together with informations about course, prevalence and kind of alcohol addiction complications were not significantly different between the group of Anonymous Alcoholics and hospitalized patients. **Results and conclusions:** On the basis of statistical analysis results there were no significant differences in types of alcoholism according to Cloninger between the group of Anonymous Alcoholics and hospitalized alcoholics. Persons taking part in Anonymous Alcoholic meetings, sustaining long alcohol abstinence are much different in the respect of personality features from general population of alcoholic

